

# Aidez vos patients à diminuer leur risque de cancer du poumon.

L'exposition au radon est la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs et en augmente considérablement le risque chez les fumeurs.

Santé Canada estime que l'exposition au radon est responsable de la mort de plus de 3 200 personnes chaque année.



Référence médicale :  
RISK ASSESSMENT FOR RADON EXPOSURE IN VARIOUS INDOOR ENVIRONMENTS, Chen, J. Radiation Protection Dosimetry, volume 185, numéro 2, Novembre 2019, pages 143 à 150, <https://doi.org/10.1093/rpd/ncy284>

1

## Dépistage

Commandez une trousse de dépistage.



2

## Résultats!


Après 91 jours, retournez la trousse au laboratoire pour obtenir les résultats.



3

## Action!

Si la concentration de radon est élevée, faites ce qu'il faut pour la diminuer.



## Votre mesure de radon remonte à quand ?

Un dépistage du radon devrait être effectué dans chaque maison au Canada, peu importe son âge ou sa taille.

## Pour diminuer le risque de cancer du poumon, il faut partir de la base.

Le radon provient du sol et c'est de cette manière qu'il pénètre dans les bâtiments. Plus la durée d'exposition au radon est longue, plus le risque de cancer du poumon est élevé. Le dépistage du radon est la seule façon de mesurer les concentrations de radon dans un bâtiment.

Les trousse de dépistage du radon sont **offertes gratuitement** aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du poumon et aux membres de leur famille.

Les patients ayant reçu un diagnostic de cancer du poumon sont admissibles à une subvention pour l'atténuation du radon afin de les aider à réduire les concentrations de radon dans leur maison.



OCCUPE  
TOI  
DU RADON

Les trousse de dépistage du radon peuvent être commandées au :  
[www.occupetoiduradon.ca](http://www.occupetoiduradon.ca)

